

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA VARICOCELECTOMÍA

D.: _____ de años de edad,
Con domicilio en _____ y DNI N° _____

D./ña.: _____ de años de edad,
Con domicilio en _____ y DNI N° _____
En calidad de _____ de _____

DECLARO

Que el Doctor/a Don.Santos Giménez Artieda, me ha explicado que es conveniente proceder en mi situación a una VARICOCELECTOMÍA.

1.- Mediante este procedimiento se pretende la mejora de la fertilidad así como la mejora de las molestias que el varicocele puede ocasionar.

La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos

2.- El médico me ha explicado que el procedimiento requiere la administración de anestesia, de cuyos riesgos me informará el servicio de anestesia.

3.- Mediante esta técnica se localizan, ligan y seccionan las venas testiculares anormalmente dilatadas.

Sé que el varicocele consiste en la dilatación anormal de las venas del testículo y su diagnóstico se produce por notar síntomas tales como sensación de pesadez escrotal o aumento del tamaño intraescrotal sobre todo al hacer algún esfuerzo (defecación, elevación de pesos, etc), o bien ser un hallazgo en el estudio por infertilidad masculina.

El médico me ha explicado que la incisión se realiza a nivel inguinal, más o menos alta, con anestesia regional o general y que el postoperatorio de esta intervención es corto, retirándose los puntos una vez se ha dado el alta hospitalaria.

4.- Comprendo que a pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como otros específicos del procedimiento como existir un porcentaje de casos en que la fertilidad no mejora a pesar de la corrección del varicocele; la persistencia de las molestias y de las dilataciones varicosas en el escroto; formación de un hidrocele (líquido en el escroto); formación de un hematoma escrotal; atrofia del testículo; aparición de una hernia inguinal; hemorragia incoercible, tanto durante el acto quirúrgico como en el postoperatorio cuyas consecuencias son muy diversas dependiendo del tipo de tratamiento que haya de necesitarse, oscilando desde una gravedad mínima hasta la posibilidad cierta de muerte, como consecuencia directa del sangrado o por efectos secundarios de los tratamientos empleados; problemas y complicaciones derivadas de la herida quirúrgica (infección con diferente gravedad, dehiscencia de sutura –apertura–, fístulas permanentes o temporales, defectos estéticos derivados de algunas de las complicaciones anteriores o procesos cicatriciales anormales, intolerancia a los materiales de sutura que puede llegar incluso a la necesidad de reintervención para su extracción, neuralgias –dolores nerviosos–, hiperestésias –aumento de la sensibilidad– o hipoestésias –disminución de la sensibilidad–).

El médico me ha explicado que estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros...) pero pueden llegar a requerir una reintervención, generalmente de urgencia, incluyendo un riesgo de mortalidad.

5.- El médico me ha explicado que para la realización de esta técnica puede ser necesaria una preparación previa, en ocasiones con peculiaridades como @14 aunque puede ser posible su realización sin una preparación completa.

También me ha explicado la necesidad de advertir de mis posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.

